

# Gebrauchsinformation

## – Bitte sorgfältig lesen!



## Myrrhentinktur MAROS

**Zusammensetzung:** 100 g Myrrhentinktur MAROS enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 g Myrrhentinktur = Tinktur aus Myrrhe (1:5 [Verhältnis Droge zu Auszugsmittel]); Auszugsmittel: Ethanol 90 % V/V.

**Sonstige Bestandteile:** keine.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

**Darreichungsform und Inhalt:** Tinktur 30 ml (= ca. 27 g).

**Pharmazeutischer Unternehmer:** MAROS Arznei GmbH, Erlanger Straße 38, 90765 Fürth/Bayern, Tel.: 09 11/7 56 57 90, Fax. 09 11/75 65 79 66, info@maros-arznei.de, www.maros-arznei.de

**Hersteller:** Gehrlicher GmbH, Robert-Koch-Straße 5, 82547 Eurasburg/Obb.

**Anwendungsgebiete:** Lokale Behandlung leichter Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Hinweis: Sollten die Beschwerden länger als 1 Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.

**Gegenanzeigen:** Myrrhentinktur ist von Alkoholkranken nicht anzuwenden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Zur Anwendung von Myrrhentinktur in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Myrrhentinktur soll daher von diesem Personenkreis nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Myrrhentinktur enthält 85 Vol.-% Alkohol.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, werden die betroffenen Schleimhautstellen 2–3-mal täglich mit der Tinktur betupft bzw. es werden zum Gurgeln und Spülen 5–10 Tropfen Tinktur in ein Glas Wasser gegeben.

**Hinweise für den Fall von Anwendungsfehlern oder Überdosierung:** Eine Einnahme größerer Mengen Myrrhentinktur kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden 21 g Alkohol aufgenommen.

**Nebenwirkungen:** Bei unverdünnter Anwendung der Tinktur können vorübergehend ein leichtes Brennen und eine Geschmacksirritation auftreten.

**Hinweise zur Aufbewahrung und Haltbarkeit:** Dicht verschlossen, vor Licht geschützt aufbewahren. Vor Feuer schützen! Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Stand der Information: Juli 2009.