Cardio ReVet RV 4-Injektionslösung für Tiere

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
1 ml enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile:
0,166 g Apis mellifica C12, 0,166 g Apocynum cannabinum C12, 0,166 g Digitalis purpurea C12, 0,166 g Prunus laurocerasus C12, 0,166 g Strychnos nux-vomica C12, 0,166 g Urginea maritina (Scilla) C12
Sonstiger Bestandteil:
Natriumchlorid
Eine vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile finden Sie unter Abschnitt 6.1.

3. Darreichungsform
Injektionslösung
Farblose, klare Lösung
Homöopathische Arzneispezialität

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Zieltierart/en
Kaninchen, Kleinnager, Marderartige, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Hunde, Katzen.

4.2 Anwendungsgebiete unter Angabe der Zieltierart/en
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
– Herzmuskelschwäche,
– Herzdekompensation,
– Herzinsuffizienz,
– Altersherz,
– Ascites oder Ödem infolge Herzinsuffizienz,
– Herzhusten infolge Stauung im Lungenkreislauf,
– Herzrhythmusstörungen,
– Asphyxie der Neugeborenen,
– Beeinträchtigung des Herzmuskels bei viralen und bakteriellen Infekten
– iatrogene Herz-Kreislaufstörungen.
Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.
Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

4.3 Gegenanzeigen
Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Bestandteilen des Präparates.

4.4 Besondere Warnhinweise (für jede Zieltierart)
Nicht konserviert. Einmalige Entnahme.

4.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren
Nicht zutreffend.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender
Nicht zutreffend.

4.6 Nebenwirkungen (Häufigkeit und Schwere)
Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

4.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode
Das Präparat kann während Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

4.8 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen
Keine bekannt.

4.9 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung und Art der Anwendung:
In Abhängigkeit vom Körpergewicht werden folgende Mengen i.v., i.m. oder s.c. injiziert:

Heimtiere, Ziervögel, Tauben	ca.	0,1- 1,0 ml
Welpen, Katzen	ca.	0,5- 2,0 ml
Hunde	ca.	1,0- 4,0 ml

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:
Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie.
In akuten Fällen:
1-2 Injektionen täglich; in perakuten, lebensbedrohlichen Fällen kann die Injektion von Cardio ReVet RV 4 stündlich wiederholt werden; bei Eintritt der Besserung seltener.
In chronischen Fällen:
2-3 Injektionen pro Woche. Bei zunehmender Besserung seltener.
Nach einleitender Injektionstherapie ist die Weiterführung der Behandlung oral möglich.

4.10 Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich
Daten zur Überdosierung liegen nicht vor.

4.11 Wartezeit/en
Null Tage

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Pharmakotherapeutische Gruppe: Alle übrigen therapeutischen Mittel
ATCvet-Code: QV03AX
Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen. Die Erkenntnisse über die Heilwirkung von homöopathischen Einzelmitteln, die aus dem Pflanzen-, Tier- und Mineralreich gewonnen werden, werden durch Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen (Arzneimittelprüfsymptome), durch Anwendung am Kranken und auf Grund von Erkenntnissen der Toxikologie gewonnen. Die Zusammenfassung ergibt das Arzneimittelbild als Grundlage der homöopathischen Therapie.
Die Wirksamkeit ist bei Übereinstimmung von Krankheitsbild und Arzneimittelbild nicht so sehr an die Dosisgröße gebunden, sondern eher an die Häufigkeit der Dosiswiederholung.
Das Kombinationsmittel Cardio ReVet RV 4 setzt sich aus homöopathischen Einzelmitteln zusammen, die vergleichbare oder einander ergänzende Anwendungsgebiete haben.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Verzeichnis der sonstigen Bestandteile
Natriumchlorid zur Isotonisierung, Aqua ad injectabilia

6.2 Inkompatibilitäten
Keine bekannt.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis: 36 Monate

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Nicht über 25°C lagern. Lichtschutz erforderlich; Präparat daher stets im Umkarton aufbewahren.

6.5 Art und Beschaffenheit des Behältnisses
2 ml Klarglasampullen

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder bei der Anwendung entstehender Abfälle
Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

7. Inhaber der Zulassung: Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co, Bensheim, Deutschland.
8. Zulassungsnummer: 8–30101
9. Datum der Erteilung der Erstzulassung/Ver-längerung der Zulassung: 21. Juli 2010.
Verbot des Verkaufs, der Abgabe und/oder der Anwendung Nicht zutreffend.
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig.