Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Euclim Tabletten

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung

1 Tablette enthält:		
Calcium phosphoricum	D6	63 mg
Magnesium phosphoricum	D6	50 mg
Kalium arsenicosum	D12	37 mg
Kalium bromatum	D12	25 mg
Cuprum arsenicosum	D12	25 mg
Natrium tetrachloroauratum	D12	50 mg

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Lactose-Monohydrat 250 mg
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. Darreichungsform

Homöopathische Arzneispezialität
Weiße, runde, biplanare, facettierte Tabletten

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den Erfahrungen der Biochemie nach Dr. Schüssler ab.
Dazu gehören Zyklusunregelmäßigkeiten und Wechseljahrbeschwerden wie z.B.:

– Periodenkrämpfe
– Stimmungsschwankungen
– Nervosität, Schlafstörungen
– Hitzewallungen

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf den Erfahrungen der Biochemie nach Dr. Schüssler.
Bei schweren Formen dieser Erkrankungen sollte eine klinisch belegte Therapie aufgrund einer ärztlichen Diagnose erfolgen.
Zell Euclim wird angewendet bei weiblichen Jugendlichen ab 12 Jahren und bei weiblichen Erwachsenen ab 18 Jahren.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Bei Zyklusunregelmäßigkeiten:
Weibliche Jugendliche ab 12 Jahren und weibliche Erwachsene ab 18 Jahren:
Zweistündlich 4 Tabletten. Jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen.
Bei Periodenkrämpfen:
Weibliche Jugendliche ab 12 Jahren und weibliche Erwachsene ab 18 Jahren:
Zu Beginn der Menstruation alle 5 Minuten 1 Tablette.
Vorbeugend, bei Neigung zu Periodenkrämpfen:
Stündlich 2 Tabletten. Jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen
Bei Nervosität, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen:
Weibliche Jugendliche ab 12 Jahren und weibliche Erwachsene ab 18 Jahren:
Stündlich 2 Tabletten. Jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen
Bei akuten Hitzewallungen:
Weibliche Erwachsene ab 18 Jahren:
Alle 20 Minuten 1 Tablette
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Art der Anwendung
Zum Einnehmen.
Die Tabletten im Mund zergehen lassen.
Die Tabletten können bis unmittelbar vor dem Essen und ab 15 Minuten nach dem Essen eingenommen werden.
Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1 Tablette enthält 250 mg Lactose-Monohydrat.
Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lapp-Lactase Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.
Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos.
Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Er-

streaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.
Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Kinder

Zell Euclim Tabletten sind nicht zur Anwendung bei Kindern vorgesehen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Zell Euclim ist nicht zur Einnahme für Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit vorgesehen.
Bei Eintritt einer Schwangerschaft ist die Einnahme von Zell Euclim zu beenden.
Daten zur Fertilität liegen nicht vor.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Zell Euclim hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Bisher sind bei der Einnahme von Zell Euclim keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das nationale Meldesystem anzuzeigen:
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/

4.9 Überdosierung

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: andere therapeutische Mittel,
ATC-Code: V03AX
Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf den Erfahrungen der Biochemie nach Dr. Schüssler.
Zell Euclim ist ein Kombinationsmittel, welches aus folgenden homöopathischen Einzelmitteln zusammengesetzt ist: Calcium phosphoricum, Magnesium phosphoricum, Kalium arsenicosum, Kalium bromatum, Cuprum arsenicosum, Natrium tetrachloroauratum. Die sich in ihren Wirkungen ergänzenden Inhaltsstoffe führen zur Verbreiterung des Wirkspektrums, zur Erhöhung der Therapiesicherheit und Therapievereinfachung.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Es liegen keine Daten zu den pharmakokinetischen Eigenschaften vor.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Für die Anwendung am Menschen sind keine besonderen Gefahren zu erwarten.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat, Calciumbehenat, Kartoffelstärke.

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Kunststoffbehälter (PP) mit Schraubkappe (PE) mit 100 und 250 g Tabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.

7. Inhaber der Zulassung
Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25A
A-5700 Zell am See

8. Zulassungsnummer
335820

9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung
3. Oktober 2014

10. Stand der Information
Jänner 2016

Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht
Rezeptfrei, apothekenpflichtig