Frontline Combo Spot on Hund M,
Lösung zum Auftropfen auf die Haut, für Hunde

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
1 Pipette mit 1,34 ml Lösung enthält:
Wirkstoff(e):
Fipronil 134,00 mg, (S)-Methopren 120,60 mg.
Sonstige Bestandteile:
Butylhydroxyanisol (E320) 0,27 mg.
Butylhydroxytoluol (E321) 0,13 mg.

Weitere Angaben siehe Frontline Combo Spot on Hund S, Lösung zum Auftropfen auf die Haut, für Hunde mit Ausnahme von:

4.2 Anwendungsgebiete unter Angabe der Zieltierart/en
Zur Behandlung von Hunden mit einem Körpergewicht von über 10 kg bis 20 kg.
- Gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken und/oder Haarlingsbefall.
  - Behandlung eines Flohbefalls (Ctenocephalides spp.). Die insektizide Wirkung auf adulte Flöhe bleibt 8 Wochen lang erhalten. Die Vermehrung der Flöhe wird durch Entwicklungshemmung der Eier (ovizide Wirkung) sowie der Larven und Puppen (larvizide Wirkung), die von den gelegten Eiern erwachsener Flöhe stammen, 8 Wochen lang nach der Behandlung verhindert.
  - Behandlung eines Zeckenbefalls (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Die akarizide Wirksamkeit des Tierarzneimittels gegen Zecken hält bis zu 4 Wochen an.
  - Behandlung eines Befalls mit Haarlingen (Trichodectes canis).
- Anwendung des Tierarzneimittels als Teil einer Behandlungsstrategie zur Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie (FAD).

4.9 Dosierung und Art der Anwendung
1 Pipette mit 1,34 ml (M) pro Hund von über 10 kg bis 20 kg Körpergewicht auf die Haut auftropfen, entsprechend einer empfohlenen Mindestdosis von 6,7 mg/kg Fipronil und 6 mg/ kg (S)-Methopren.
Der Mindestabstand zweier Behandlungen soll nicht weniger als 4 Wochen betragen, da die Verträglichkeit für kürzere Behandlungsintervalle nicht geprüft wurde.
Hinweis zur sicheren Anwendung:
Die Pipette aufrecht halten. Leicht klopfen, damit sich die Flüssigkeit vollständig im Hauptteil der Pipette sammelt. Spitze der Pipette an der dafür vorgesehenen Stelle abknicken.
Das Fell in der Nackenregion vor den Schulterblättern des Tieres scheiteln, bis die Haut sichtbar wird. Die Spitze der Pipette auf die Haut aufsetzen und den Inhalt durch mehrmaliges Drücken an einer Stelle auf der Haut vollständig entleeren.
An der Applikationsstelle können vorübergehende Fellveränderungen (verklebte/fettige Haare) auftreten.

6.5 Art und Beschaffenheit des Behältnisses
Art des Primärbehältnisses:
Grüne Pipette, mit Spitze zum Abknicken, bestehend aus einer hitzegeformten Schale (aus Polypropylen und Polyacrylnitrilmethylat-Copolymer) mit Verschlussfolie (aus Polyethylenterephthalat, Aluminium und Polyacrylnitrilmethylat-Copolymer).
Packungsgrößen:
Packung mit 1 Pipette (1 Blister mit 1 Pipette) mit 1,34 ml Lösung.
Packung mit 3 Pipetten (1 Blister mit 3 Pipetten) mit jeweils 1,34 ml Lösung.
Packung mit 6 Pipetten (2 Blister mit 3 Pipetten) mit jeweils 1,34 ml Lösung.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

7. Inhaber der Zulassung: Merial SAS, Lyon, Frankreich.
8. Zulassungsnummer: 8–00597
9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung: 9. Jänner 2004.
10. Stand der Information: Mai 2011.
Verbot des Verkaufs, der Abgabe und/oder der Anwendung Nicht zutreffend.
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig.