

**GEBRAUCHSINFORMATION:  
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

# Bronchostop<sup>®</sup> sine Hustensaft

0,129 g/15 ml Thymiankraut-Trockenextrakt,  
0,830 g/15 ml Eibischwurzel-Auszug  
Flüssigkeit zum Einnehmen  
Zur Anwendung bei Erwachsenen,  
Jugendlichen und Kindern ab 3 Jahren.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser fühlen oder wenn Sie sich schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* beachten?
3. Wie ist *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* und wofür wird er angewendet?**

*BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Linderung von Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reizhusten sowie zur Förderung des Abhustens bei produktivem Husten im Zusammenhang mit einer Erkältung.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

#### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* beachten?**

***BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* darf nicht eingenommen werden**

wenn Sie allergisch gegen Thymian-trockenextrakt, Eibischwurzel-flüssigextrakt, ein anderes Mitglied aus der Familie der Lippenblütler, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* ist in folgenden Fällen erforderlich:**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* einnehmen, wenn Sie Asthma haben oder zu allergischen Reaktionen neigen, da *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* die Asthmasymptome verschlimmern kann. Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Arzneimittel bei Patienten, die zu allergischen Reaktionen neigen, allergische Reaktionen, in sehr seltenen Fällen Anaphylaxie einschließlich anaphylaktischem Schock, auslösen kann. Bei Fieber, Atemnot oder eitrigem Auswurf ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Kinder**

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren kann nicht empfohlen werden, da keine ausreichenden Daten vorliegen und eine medizinische Beratung in Anspruch genommen werden sollte.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auf-

treten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

#### **Einnahme von *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* mit anderen Arzneimitteln**

Es wurden keine Wechselwirkungen von *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* mit anderen Arzneimitteln bekannt. Untersuchungen zu möglichen Wechselwirkungen von *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* mit anderen Arzneimitteln liegen nicht vor.

Die Aufnahme von gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln kann verzögert sein. Als Vorsichtsmaßnahme sollte das Produkt nicht ½ bis 1 Stunde vor oder nach der Einnahme von anderen Arzneimitteln eingenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen.

Es liegen keine Daten über die Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit vor.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

#### ***BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* enthält Xylitol.**

15 ml dieses Arzneimittels enthalten 4,61 g Xylitol. Der Kalorienwert beträgt 2,4 kcal/g Xylitol. Xylitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

#### ***BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* enthält Himbeersaftkonzentrat, welches Sucrose, Glucose und Fructose enthält.**

Dieses Arzneimittel enthält 66 mg Fructose pro 15 ml Lösung entsprechend 440 mg/100 ml.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der Fructose nicht abgebaut werden kann – festgestellt wurde.

#### ***BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* enthält Propylenglycol.**

Dieses Arzneimittel enthält 33,3 mg Propylenglycol pro 15 ml.

#### **3. Wie ist *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* einzunehmen?**

Nehmen Sie *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:  
15 ml alle 3 bis 4 Stunden, 4-mal täglich, bei Bedarf bis zu 6-mal täglich; Tagesgesamt-dosis bis zu 90 ml.

Kinder von 6 bis 11 Jahren:  
7,5 ml alle 3 bis 4 Stunden, 4-mal täglich, bei Bedarf bis zu 6-mal täglich; Tagesgesamt-dosis bis zu 45 ml.

Kinder von 3 – 5 Jahren:  
7,5 ml alle 3 bis 4 Stunden, 4-mal täglich; Tagesgesamt-dosis bis zu 30 ml.

Patienten mit Leber- und/oder Nieren-funktionsstörungen:

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren- oder Leber-funktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Nehmen Sie *BRONCHOSTOP<sup>®</sup> Sine Hustensaft* unverdünnt ein, indem Sie die oben angegebene Dosis in den beiliegenden Messbecher geben. Der Messbecher weist eine Skalierung zwischen 2,5 ml und 20 ml auf.

